




ဂျပန်နိုင်ငံတွင် လက်ရှိမှာပင်  
နဝေဉ်ပျမ်းမျှအားဖငြ

လူ 28 ဦးသည် တိဘီရေဂါရုံကကြောင်း  
စစ်ဆေးတွေရုံရဆဲဖဖြေသည်။

ချောင်းဆိုး၊ သလိပ်များသည်  
2ပတ်နှင့်အထက်  
ဆက်တိုက်ဖဖြေခေငြး၊  
အဖျားငွေငွေရုံခငြးနှင့်  
ခနုဓာကိုယ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ် တို့ ဆက်နပေါက  
အမဖြေဆိုးကျန်းမာရေးကုသမှုခံယူပါ။



- ဂျပန်နိုင်ငံတွင် တိဘီရေဂါရုံအသစ်အများစုသည် သက်ကြီးရွယ်အိုများ ဖဖြေပိလေးပံ့သုံးပံ့ခန်(74%)သည် အသက် 60 နှင့်အထက်များဖဖြေသည်။
- အထူးသဖြင့် နိုင်ငံခြားဖွားလူငယ်လူနာများ၏ ရာခိုင်နှုန်းသည် တိုးများလာနပိလေးလူငယ်ပိုင်း (20မှ 29နှစ်) ရှိ လူနာအသစ်များ၏ လေးပံ့သုံးပံ့ခန်(77.5%)



# တီဘီရောဂါအကန့်အသတ်ခြင်း အမေးအဖြေ 5 ခု

## Q1 တီဘီရောဂါလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ?

**A1** တီဘီရောဂါ၏ လက္ခဏာများ (ကပြရပါမည့် ချောင်းဆိုးခြင်း၊ သလိပ်၊ အဖျားငွေ့ငွေ့၊ ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်စသည်) တွင် တူးခြင်းသည့်လက္ခဏာမရှိဘဲ အစောပိုင်း အဆင့်များတွင် မသိသာခြင်း များသောကြောင့် အထူးသဖြင့် သက်ကဲရွယ်အိုများသည် သတိမထားမိခင်မှာပဲ ရောဂါအဆင့်တိုးသွားတတ်ပါသည်။ ချောင်းဆိုးခြင်း သို့မဟုတ် သလိပ်ထွက်ခြင်းတို့ 2 ပတ်နှင့်အထက် ဆက်ဖွဲ့ခြင်း၊ အဖျားငွေ့ငွေ့ရှိခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်ညှောင်းညှာခြင်းတို့ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပါက အမိန့်ဆုံးကျန်းမာရေးကုသမှုခံယူပါ။

## Q2 တီဘီရောဂါက ဘယ်လိုကူးစက်သလဲ?

**A2** တီဘီရောဂါ အဆင့်တိုးလာသောအခါတွင် ချောင်းဆိုးခြင်း၊ နှာချောင်းတိုက်ခြင်း လွယ်ကူစွာ တီဘီရောဂါပိုးများ ပျံ့လွင့် နေပါသည်။ ထိုတီဘီရောဂါပိုးကို ရှူရှိုက်ခြင်းဖြင့် အနီးနားမှလူများသို့ ကူးစက်ပျံ့နှံ့သွားပါသည်(လေမှတစ်ဆင့် ကူးစက်ခြင်း)။

## Q3 ပုံမှန် သတိထားရမည့်အရာတွေကဘာတွေလဲ?

**A3** ပုံမှန်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု ခံယူရန် အရေးကြီးပါသည်။ တီဘီရောဂါဖြစ်နေလျှင်ပင် စောစီးစွာ သိရှိထားပါက ပိုမိုဆိုးရွား လာမှုကို ကာကွယ်ရုံသာမက သင့်မိသားစုနှင့် သူငယ်ချင်းများထံ ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုကိုလည်း တားဆီးနိုင်ပါသည်။

## Q4 ဂျပန်နိုင်ငံ၌ ဘယ်လိုလူများတွင် တီဘီရောဂါကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါသလဲ?

**A4** တီဘီရောဂါလူနာသစ်များတွင် သက်ကဲရွယ်အိုများသည် အများစုဖြစ်ပြီးလေးပုံသုံးပုံခန့်မှာ အသက် 60 နှင့်အထက်များ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် အထူးသဖြင့် နိုင်ငံခြားဖွားလူငယ်ပိုင်းလူနာရာခိုင်နှုန်းများလည်း တိုးလာပြီး အသက် 20 မှ 29 နှစ် ကြား လူနာသစ်များ၏ လေးပုံသုံးပုံခန့်ရှိပါသည်။

## Q5 တီဘီရောဂါကို ကုသလျှင် ပျောက်ကင်းနိုင်ပါသလား?

**A5** တီဘီရောဂါသည် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ဆေးဝါးများ (တီဘီရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဆေးစသည်) ပုံမှန်သောက်သုံး ခြင်းဖြင့် ပျောက်ကင်းနိုင်ပါသည်။ ပုံမှန်ကုသမှုကာလသည် 6 လမှ 9 လ ဖြစ်ပါသည်။ ကုသနေစဉ်အတွင်း ဆေးသောက် ခြင်းကို ရပ်လိုက်ခြင်း၊ ညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်း ဆေးမသောက်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပါက တီဘီပိုးသည် ဆေးကို ခုခံနိုင်စွမ်း (ခံနိုင်ရည်) ရှိသွားပြီး ဆေးယဉ်ပါးသည့်တီဘီရောဂါပိုး (ခံနိုင်ရည်ရှိရောဂါပိုး) ဖြစ်သွားနိုင်ခြေရှိပါသည်။ ဆရာဝန် ၏ညွှန်ကြားချက်ကို လိုက်နာပြီး ပြီးဆုံးသည်အထိ ဆေးကိုသေချာစွာဆက်သောက်ရန်မှာ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါသည်။

